



Clé de détermination en structure



Les pourcentages (exprimés en nombre de tiges de plus de 17,5 cm de diamètre) ne concernent que les essences objectifs.



- S'étalonner sur les limites des catégories de diamètres par des mesures au compas, dès lors que l'on change de type de milieu.

- Pour estimer "à l'œil" les proportions en effectifs des tiges d'essences objectifs par catégories, un compteur à touches peut être utile.
- Dans le cas d'essences nobles en cépées, ne compter que le plus beau brin.



Ne pas sous-estimer les PB : les "chercher" aussi loin que les GB et les prendre en compte quelle que soit leur qualité actuelle.

Ne pas être influencé par le traitement : on peut rencontrer un peuplement de structure irrégulière traité en futaie régulière et réciproquement.

Codifications

Capital

Composition

Codification de la surface terrière	
0	$G \leq 5 \text{ m}^2$
1	$5 < G \leq 10 \text{ m}^2$
2	$10 < G \leq 15 \text{ m}^2$
3	$15 < G \leq 20 \text{ m}^2$
4	$20 < G \leq 25 \text{ m}^2$
5	$25 < G \leq 30 \text{ m}^2$
6	$G > 30 \text{ m}^2$

Recouvrement de chêne > 2/3	A
- chêne pur (proche 100 %)	A1
- chêne avec hêtre	A2
- chêne avec charme	A3
- chêne avec divers *	A4
Recouvrement de hêtre > 2/3	B
- hêtre pur (proche 100 %)	B1
- hêtre avec chêne	B2
- hêtre avec charme	B3
- hêtre avec divers *	B4
Recouvrement de chêne et hêtre > 2/3 et chacun > 1/5	C
- chêne et hêtre (proche 100 %)	C1
- chêne et hêtre avec charme	C2
- chêne et hêtre avec divers *	C3
Recouvrement des autres nobles > 50 %	D
- essence noble dominante *	D1
- essence noble dominante * avec essence noble complémentaire *	D2
Recouvrement des essences non nobles > 2/3	E
- essence non noble dominante *	E1
- essence non noble dominante * avec essence non noble complémentaire *	E2
Autres cas : peuplements mélangés	F



• Pour estimer “à l’œil” la surface terrière des essences nobles par classe de 5 en 5 m², s’étalonner avec des mesures régulières au relascope, notamment en cas de changement net de type de milieu.

* préciser l’essence majoritaire



• Diviser par 5 la surface terrière trouvée, puis, arrondir à l’unité inférieure pour obtenir la classe (exemple : si $G = 16$, $16 / 5 = 3,2$ qu’on arrondit à 3).



• C’est une estimation “à l’œil” du pourcentage de couvert de toutes les essences de plus de 17,5 cm de diamètre, “qui ont la cime en pleine lumière” (étage localement dominant).

Utilisation pratique en description de peuplements



La typologie des peuplements feuillus irréguliers de Franche-Comté est un outil de diagnostic qui facilite la cartographie des peuplements.

La description des peuplements se fait à l’avancement. Elle cherche à réaliser sur le terrain des synthèses à une échelle utile pour la gestion sylvicole.

Sauf cas particulier, on se limite à un seuil minimal de perception de 50 ares et à 3 ou 4 zones différentes par parcelle.